

牧草・飼料作物奨励品種一覧

令和7年（2025年）2月

熊本県農林水産部生産経営局畜産課

熊本県牧草・飼料作物奨励品種一覧(令和7年(2025年)2月6日改定)

		早 晩 性	相 対 熟 度	品 名 (商 品 名)	指 定 年 度	収 量 性	耐 倒 伏 性	耐 病 性	地域適応性			摘 要
									平 坦 地 域	中 山 間 地 域	高 原 地 域	
ト ウ モ ロ コ シ	春播き	早生	105	TX1235(ロイヤルデントTX1235)	R2	◎	◎	○	◎	◎		茎葉収量性に優れる。
		早生	108	34N84(パイオニア108日)	H22	◎	○	○	◎	◎		収量性に優れる。紋枯病頻発ほ場においては連作を避けること。
		早生	108	LG3490(スノーデント108)	R3	◎	◎	○	◎	◎		多収性及び耐倒伏性に優れる。
		早生	108	KD580(ゴールドデントKD580)	R元	◎	◎	○	◎	◎		茎葉収量性及び耐倒伏性に優れる。
		早生	110	LG30500(スノーデント110)	R5	○	◎	○	◎	◎		耐倒伏性に優れる。
		早生	110	P1204(P1204)	R5	◎	◎	○	◎	◎		収量性及び耐倒伏性に優れる。
		早生	112	DH522(Z-Corn112)	R3	◎	◎	○	◎	◎		多収性及び耐倒伏性に優れる。
		早生	113	タカネスター(長交C949号)	H22	◎	○	○	◎	◎		収量性に優れる。紋枯病頻発ほ場においては連作を避けること。
		早生	114	KD641(ゴールドデントKD641)	H29	◎	◎	○	◎	◎		茎葉・雌穂ともに収量性に優れる。耐倒伏性に優れる。
		早生	115	TX1334(ロイヤルデント115)	H30	◎	○	○	◎	◎		茎葉・雌穂ともに収量性に優れる。
		早生	115	JG7024(グリーンデント115)	H30	◎	○	○	◎	◎		茎葉収量性に優れる。
		早生	115	P1341(P1341)	R6	◎	◎	○	◎	◎		収量性及び耐倒伏性に優れる。
		早生	115	LG31.588(スノーデント115)	R6	○	◎	○	◎	◎		耐倒伏性に優れる。
		中生の早	118	P2088(パイオニア118日)	H27	◎	◎	◎	◎	◎		大型の草姿だが、着雌穂高が低く耐倒伏性に優れる。安定して収量が高い。
		中生の早	118	KE1671A(サイレージコーンNS118スーパー)	H29	◎	○	◎	◎	◎		大型の草姿で茎葉収量性に優れる。紋枯病・ごま葉枯病等に強い。
		中生	120	TX1162(ロイヤルデントTX1162)	H27	○	◎	◎	◎	◎		雌穂収量性に優れ、ごま葉枯病に強い。
		中生	123	P2105(パイオニア123日)	R4	◎	○	○	◎	◎		着子穂高が低く耐倒伏性に優れ、雌穂収量性に優れる。
		中生	123	9F053(クミアイデント123)	H16	◎	○	○	◎	◎		雌穂収量性に優れる。大型の草姿。
		中生	123	KD731(ゴールドデントKD731)	H24	◎	○	○	◎	◎		茎葉収量性に優れる。大型の草姿。
		中生	124	TX1277(ロイヤルデントTX1277)	R4	◎	○	○	◎	◎		耐倒伏性に優れ、子実・茎葉ともに多収。
		中生	125	SH2821(スノーデント125T)	R4	◎	○	○	◎	◎		大型の草姿で収量性に優れる。ごま葉枯病、すす紋病抵抗性に優れる。
	夏播き	127	PI2008(スノーデントおとは)	H30	○	◎	○	◎	◎	◎		茎葉収量性に優れ、着雌穂高が低い。
		130	P3898(パイオニア130日)	R4	○	○	○	◎	◎	◎		茎葉収量性に優れる。
		135	SH2933(スノーデント夏皇)	H28	○	○	○	◎	◎	◎		茎葉収量性に優れる。

注: 早晚性、相対熟度については、メーカー発表数値

草 種 名		早 晩 性	(品 種 名) (商 品 名)	指 定 年 度	収 量 性	耐 倒 伏 性	耐 病 性
ソ ル ガ ム	ス ー ダ ン グ ラ ス	極早生	ヘイスーダン(HSK-I、HS-K1)	H17	◎	◎	○
		極晩生	スーパーダン2(ロールキング)	H18	◎	○	○
	ス ー ダ ン 型	早生	スダックス(SX11)	S57	◎	○	◎
	ソ ル ゴ ー 型	中晩生	シュガーグレイズ(甘味ソルゴー、ハチミツソルゴー他)	H5	◎	○	○
		中生	ハニーソルゴー	H18	◎	○	○
	兼 用 型	早生	ハイグレンソルゴー(GS401、GS408)	S61	◎	○	○

注:早晩生については、メーカー発表数値

地域適応性			摘 要
平 坦 地 域	中 山 間 地 域	高 原 地 域	
◎	○		生育が早く、再生草の生育も良い。
◎	○		一番草の乾物収量が高い。やや倒伏しやすい。
◎	○		多収である。
◎	○		多収で、糖度高い。
◎	○		一番草、再生草ともに多収。
◎	○		子実多い。鳥害防止対策が必要。

草 種 名	早 晩 性	(品 種 名) (商 品 名)	指 定 年 度	地 域 適 応 性					摘 要
				乾 草	サ イ レ ー ジ	平 坦 地 域	中 山 間 地 域	高 原 地 域	
イタリアン ライグラス	極早生	Kyushu 1	R元	◎	◎	○	○		いもち病抵抗性を有する。9月播種を推奨。
	極早生	ワセフドウ	R元	◎	◎	○	○		極早生と早生の間品種で、多収。
	早生	ワセユタカ	S57	◎	◎	◎	○	○	直立型で西南暖地向きの裏作向け、多収。
	早生	ワセアオバ(イタリアンライグラス農林3号)	S57	◎	◎	◎	○	○	耐雪性強く直立型。倒伏性に強く、多収。
	早生	タチワセ	H元	◎	◎	○	○		直立型で、機械適応性に優れる。
	早生	タチマサリ	H9	◎	◎	○	○		直立型で、広葉型で多収。
	早生	ワセホープ	H17	◎	◎	○	○	○	3月中に出穂し、穂ばらみ期以降でも倒伏しない。
	早生	ワセパワー	R4	◎	◎	○	○		直立型で草丈が高く、多収。耐倒伏性に優れる。
	早生	KAIR-E1803(すくすくダッシュ)	R4	◎	◎	○	○		直立型で、分けつが多いため細茎でも多収。
	早生	JFIR-20(うし想い)	H28	○	◎	◎	○		草丈が高く、多収。耐倒伏性に優れる。硝酸態窒素の蓄積が少ない。
	早生	SI-14(タチユウカ)	H28	○	◎	◎	○		立型の草姿で、多収。耐倒伏性に優れる。硝酸態窒素の蓄積が少ない。
	中生	テティラ(ジャイアント)	H元	○	○	◎	○	○	4倍体品種。茎葉が大きく、再生力旺盛、多収。
	中生	タチムシャ	H14	◎	◎	◎	◎	○	直立型で耐倒伏性強く、大型の多収品種。
	中生	KAIR-12M(さつきばれEX)	R元	○	◎	◎	○		立型の草姿で倒伏に強い。草丈が高く、多収。
	晩生	エース	H元	○	○	◎	○	○	4倍体品種。茎葉が大きく、再生力旺盛。
	晩生	ビリケン(マンモスB)	H9	○	◎	○	○		4倍体品種。再生力旺盛で、6月頃まで刈り取り可能、葉肉が厚く多収。
	晩生	タチサカエ	H21		◎	◎	○		4倍体品種。収量性に優れる。
	晩生	KAIR-12TE(ダイヤモンド)	R4	○	◎	◎	○		4倍体品種。立型の草姿で倒伏に強い。収量性に優れる。
	極晩生	アキアオバ3(友系28号)	H21		◎	◎	○		4倍体品種。刈り取り適期までの生育期間が長いので多収であるが、倒伏に注意が必要。

草 種 名	早 晩 性	(品 種 名) (商 品 名)	指 定 年 度	地 域 適 応 性					摘 要
				乾 草	サ イ レ ー ジ	平 坦 地 域	中 山 間 地 域	高 原 地 域	
エンバク	極早生	隼(スーパーハヤテ「隼」)	H9		○	◎	○	○	耐倒伏性に優れ、多収、播種適期が長い。
	極早生	九州14号	H25		◎	◎	○	○	9月中の播種であれば、平坦地では年内出穂が可能。耐倒伏性に優れる
	極早生	スナイパー(A-19)	H27		○	◎	○	○	9月中の播種であれば、平坦地では年内出穂が可能。ネコブセンチュウの増殖を抑制する。
	極早生	K78R7(アーリーキング)	H27		○	◎	○	○	極強の耐倒伏性。多収。
	中生	ニューオールマイティー	H9		◎	◎	○	○	茎が太く、直立型で、再生良く多収。
ラ イ 麦	晩生	春一番	S57		○	○	◎	◎	耐雪性強く、おそ播き可能。
ロ ー ズ グ ラ ス	早生	カタンボラ	S57	◎		◎	○		草質柔らかく、再生良好。
ギ ニ ア グ ラ ス		ナツカゼ(ギニアグラスナツカゼ)	S63	○	○	◎	○		多収であり、青刈りに適する。機械による踏圧再生がやや悪い。
ヒ エ 類	中生	KSO-JBM2(グリーンミレット中生)	H27		◎	◎	○	○	乾物収量が高く、水田、畑利用に適する。嗜好性が高い。
	中生	青葉ミレット(アオバミレット)	H27		◎	◎	○	○	乾物収量が高く、水田、畑利用に適する。

草 種 名	早 晩 性	(品 種 名) (商 品 名)	指 定 年 度	用 途		摘 要
				子 実 利 用	サ イ レ ー ジ	
飼料イネ	極早生	ぺこあおば	H23	○	○	飼料用米・WCS兼用品種。高冷地早植えに向き、短稈穂重型で、耐倒伏性に優れ、多収。一穂粒数多く、大粒で脱粒は難。
	早生	夢あおば(北陸187号)	R3	○	○	飼料用米・WCS兼用品種。耐倒伏性に優れ、子実は多収。ただし、WCS利用では刈り遅れに注意。
	中生	ホシアオバ(中国146号)	H13	○	○	飼料用米・WCS兼用品種。長稈穂重型で、耐倒伏性に優れ、脱粒やや難、大粒で識別性有り。高冷地では早生に属し、多収。
	中生	つきあやか(中国飼225号)	R6		○	WCS用イネ品種。極短穂型で、糖含量が高い。
	極晩生	タチアオバ(西海飼253号)	H19	○	○	飼料用米・WCS兼用品種。長稈茎葉型で、脱粒難、多収であり、耐倒伏性に優れる。
	極晩生	ミナミュタカ	H23		○	WCS用イネ品種。長稈茎葉型で、多収であり、耐倒伏性に優れるが、脱粒難。
	極晩生	たちすずか(中国198号、中国飼198号)	H27		◎	WCS用イネ品種。極短穂型で、茎葉の糖分含量が高い。
	極晩生	つきすずか(中国飼219号)	R元		◎	縞葉枯病抵抗性を有するWCS用イネ品種。極短穂型で、茎葉の糖分含量が高い。

草 種 名	早 晩 性	(品 種 名) (商 品 名)	指 定 年 度	耐 寒 性	用 途				利 用 年 限	地域適応性			一 番 草 出 穂	摘 要
					青 刈	乾 草	サ イ レ ー ジ	放 牧		平 坦 地 域	中 山 間 地 域	高 原 地 域		
オ ー チャードグ ラス	極早生	アキミドリⅡ	H14	◎	◎	◎	◎	◎	6年以上			◎	5.中	秋の再生に優れ、ウドンコ病に強い
	早生	ナツミドリ	H9	◎	◎	◎	◎	◎	6年以上			◎	5.中	越夏性及び耐病性に優れ、秋の収量高い。
ペレニアルライグ ラス	晩生	フレンド(マンモスペレニアル)	S60	◎	◎	◎	◎	◎	3年以上			◎	6.中	4倍体、分けつ多く、再生良好。
	晩生	夏ごしペレ	R3	◎	◎	◎	◎	◎	3年以上			◎	5.上	多収性及び耐暑性に優れる。初期生育及び再生良好。
ト ー ル フェ ス ク	中生	ウシブエ	H18	◎	◎	◎	◎	◎	6年以上	○	◎	◎	5.中	越夏性及び永続性に優れる。安定多収、再生力旺盛、放牧地利用。
ク ロ ー バ	中生	フィア(ニュージーランドホワイт)	S57	○			○	◎	6年以上			◎		葉は小葉で密度高く、再生、永続性良好。
バ ヒ ア グ ラ ス	中生	ペンサコラ	H14					◎	6年以上	◎	◎			2倍体で有性生殖。耐寒性ややあり。
シ バ 類		センチピードグラス	H8					◎	6年以上	◎	◎			採食性良好で、被覆密度が高い。
		在来種(ノシバ)	H8					◎	6年以上	◎	◎			草地の被覆密度が高く、再生旺盛で牧養力が高い。

注:出穂期は草地畜産研究所の成績。

主な改正点

草 種	品 種 名 (商 品 名)	改 正 点
春播きトウモロコシ	P1341 (P1341)	追加
春播きトウモロコシ	LG31. 588 (スノーデント115)	追加
飼料イネ	つきあやか (中国飼225号)	追加
夏まきトウモロコシ	P2307 (パイオニア125日)	廃止 (販売中止のため)
イタリアンライグラス	さちあおば	廃止 (販売中止のため)