

令和 4 年度

酸性雨調査報告書

環境科学調査センター

目 次

1. 湿性降下物

I 調査目的 . . . . . 1

II 調査地点 . . . . . 1

III 調査方法 . . . . . 2

IV 調査結果 . . . . . 5

2. 乾性降下物

I 調査目的 . . . . . 1 3

II 調査地点 . . . . . 1 3

III 調査方法 . . . . . 1 3

IV 調査結果 . . . . . 1 4

3. 参考文献 . . . . . 2 1

資料 測定結果 . . . . . 2 2

## 1. 湿性降下物

### I 調査目的

本市では昭和 58 年度後期より酸性雨調査を継続して行っており（昭和 58 年度後期～62 年度は環境庁（現：環境省）が実施した酸性雨長期モニタリング指定地区（全国 7 地区）として受託）、令和 4 年度も長期的な酸性雨の監視のため、1 地点での測定を継続した。

### II 調査地点

調査地点は、次の通りである。（図 1）

ア 名古屋市環境科学調査センター（以下、環科セとする）

所在地 南区豊田

採取装置 降水時開放型捕集装置

（小笠原計器製作所：US330）

設置場所 屋上

なお、平成 12 年度より、一週間の捕集を従来の酸性雨ろ過式採取器から、非降雨時における乾性降下物の影響を除くため、Wet-Only の降水時開放型捕集装置に変更した。

また、昭和 58 年度から平成 2 年度までは、名東区の愛知カンツリー倶楽部（以下、愛知 C とする）で、ろ過式採取器による測定を行っていたが、クラブハウスの建て替えにより採取ができなくなり、鳴海配水場（以下、鳴海とする）に変更した。

さらに、昭和 58 年度から平成 19 年度までは、南区の環科セと鳴海にて、ろ過式採取器または降雨時開放型捕集装置による採取を行っていたが、平成 20 年度～21 年度は鳴海のみ、平成 22 年度からは環科セのみでの採取とした。




図1 調査地点

### Ⅲ 調査方法

調査には、降水時開放型捕集装置[以下、ウェットオンリー (Wet-Only) ] (図 2) を使用した。


Wet-Only は感雨器と移動式の蓋を備えており、非降雨時における粉塵などの乾性降水物の混入を防ぎ、降雨時の湿性降水物のみを捕集する。また、冷蔵庫を有し、捕集した雨水を回収時まで冷蔵保存する。採取期間は原則として一週間であり、期間中の雨水はまとめて複数の降水も 1 検体とする。

Wet-Only の測定項目を表 1 に示す。また、各測定項目の分析方法とその検出限界を表 2 に示す。

月毎のデータを算出する時の区切りについて、Wet-Only は上記のように週単位の採取をしているため、通常月の区切りとは一致していない。

各機器の令和 4 年度における集計期間を表 3 に示す。

分析の結果、得られたデータの信頼性について、イオンバランスの検定および電気伝導率の計算値と測定値の比較により QA/QC を行い、必要に応じて再分析を実施した。しかし、再分析の結果、なお信頼性の範囲を超える検体もあった。



W e t - O n l y

図 2 降水時開放型捕集装置図

表 1 測定項目

測定項目	試料	Wet-Only 捕集装置	
		湿性	ろ過残渣
pH		○	-
EC(電気伝導度)		○	-
降下物量		-	○
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		○	-
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		○	-
Cl <sup>-</sup>		○	-
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>		○	-
Ca <sup>2+</sup>		○	-
Mg <sup>2+</sup>		○	-
K <sup>+</sup>		○	-
Na <sup>+</sup>		○	-

表 2 分析の方法と検出限界

分析項目	分析方法	使用機器	検出限界
pH	ガラス電極法	堀場 F-72	0.001
EC	導電率計による方法	DKK CM-30R	0.01(25°C μS/cm)
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	イオンクロマト法	930 Compact IC Flex	0.0015(μg/mL)
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	同上	同上	0.00073(μg/mL)
Cl <sup>-</sup>	同上	同上	0.00092(μg/mL)
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	同上	930 Compact IC Flex	0.0020(μg/mL)
Ca <sup>2+</sup>	同上	同上	0.0046(μg/mL)
Mg <sup>2+</sup>	同上	同上	0.0024(μg/mL)
K <sup>+</sup>	同上	同上	0.0042(μg/mL)
Na <sup>+</sup>	同上	同上	0.00099(μg/mL)

表 3 令和 4 年度月別の集計期間

年 月	Wet-Only 捕集装置
令和 4/4	3/28 ~ 4/25
5	4/25 ~ 6/6
6	6/6 ~ 7/4
7	7/4 ~ 8/1
8	8/1 ~ 8/29
9	8/29 ~ 9/26
10	9/26 ~ 11/7
11	11/7 ~ 12/5
12	12/5 ~ 1/4
令和 5/1	1/4 ~ 1/30
2	1/30 ~ 2/27
3	2/27 ~ 3/27

#### IV 調査結果

##### (1) 降雨状況

昭和59年度～令和4年度の降水量の経年変化を図3に示す。令和4年度は、オーバーフローは認められなかった。令和4年度の環科セの年間降水量（Wet-Onlyによる貯水量より算出）は、1541mm（令和3年度：1650mm）であった。令和4年度の年間降水量は過去10年間（平成24年度～令和3年度）の降水量と比較してほぼ平均的な値であり、令和3年度との比較では減少した。

続いて令和4年度の月別降水量を図4に示す。月別では、9月に約291mm、7月に273mmと、秋雨の時期や梅雨の時期に活発な前線の影響を受けて降水量が多く、年間降水量を押し上げる結果となった。降水量が最も少ない月は12月の20mmであった。




図3 降水量の経年変化




図4 月別降水量

## (2) pH

令和 4 年度の加重年平均 pH は 5.24 であった。

経年変化を図 5、表 4 に示す。令和 4 年度の加重年平均 pH は測定開始以降で 3 番目に高い値となった。近年は降水中のイオン成分が減少してきているため、平成 22 年度以降の pH は平成 26、29 年を除いて 5 を上回っており、高い値で推移しており、令和 4 年度も同様の傾向が認められた。

週毎の pH 別検体数を表 5 に示す。pH4 以下の検体は令和 4 年度はなかった。令和 3 年度以前と比較すると、近年と同様に pH が 5 以上の検体数が多く、pH5 未満の検体数が少なかったために、令和 3 年度同様に高い、年間の加重平均値となった。

最高、最低、平均（単純平均および加重平均）を表 6 に、pH 加重平均値経月変化を図 6 に示す。pH は最高値が 6.68、最低値が 4.10 であった。月ごとの値では、pH が最も高くなったのが 1 月、最も低くなったのが 8 月であった。




図 5 加重平均 pH の経年変化率（ろ過式捕集装置と Wet-Only 捕集装置）  
（ろ過式捕集装置：昭和 59~平成 11、Wet-Only 捕集装置：平成 12~）

表 4 年降水量と加重年平均 pH

	降水量 mm			pH		
	環科セ	愛知C	鳴海	環科セ	愛知C	鳴海
1984	1000	1090	-	4.8	4.6	-
1985	1390	1430	-	4.8	4.7	-
1986	1310	1420	-	4.9	4.7	-
1987	1090	1200	-	4.9	4.7	-
1988	1570	1740	-	4.7	4.6	-
1989	1590	1680	-	4.8	4.7	-
1990	1660	1730	-	5.1	4.9	-
1991	1790	1760	1590	4.9	4.9	4.9
1992	1410	-	1270	4.7	-	4.6
1993	1610	-	1640	4.9	-	4.8
1994	1050	-	1040	4.9	-	4.9
1995	1380	-	1420	4.9	-	4.8
1996	960	-	970	4.8	-	4.7
1997	1620	-	1760	4.9	-	4.8
1998	1671	-	1648	5.15	-	5.1
1999	1432	-	1392	5.08	-	5.05
2000	1769	-	1909	4.73	-	4.74
2001	1477	-	1436	4.52	-	4.54
2002	1078	-	1306	4.78	-	4.81
2003	1539	-	1594	4.73	-	4.7
2004	1942	-	1940	4.95	-	5
2005	1096	-	1064	4.65	-	4.65
2006	1515	-	1492	4.69	-	4.71
2007	1409	-	1369	4.83	-	4.76
2008		-	1680	-	-	4.73
2009		-	1825	-	-	4.92
2010	1360	-	-	5.10	-	-
2011	1475	-	-	5.05	-	-
2012	1415	-	-	5.24	-	-
2013	1524	-	-	5.03	-	-
2014	1411	-	-	4.96	-	-
2015	1769	-	-	5.10	-	-
2016	1526	-	-	5.24	-	-
2017	1556	-	-	4.99	-	-
2018	1447	-	-	5.20	-	-
2019	1725	-	-	5.21	-	-
2020	1737			5.38		
2021	1650			5.30		
2022	1541			5.24		

(S59~H11 : ろ過式捕集装置) (H12~ : Wet-Only 捕集装置)

昭和 58 年度は、年度半ばから調査を開始したため、表から除外している。  
 平成 9 年度まで降水量は整数第 2 位 (第 1 位四捨五入)、pH は小数点第 1 位までの表示、平成 10 年度  
 から降水量は整数第 1 位、pH は小数点第 2 位まで表示した。

表 5 湿性降下物試料の pH 分布

Wet-Only 捕集装置 (環科セ)

月	4年										5年			計
pH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
6.0<	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	
5.0< ≤6.0	2	5	4	4	2	3	4	4	2	2	2	2	36	
4.0< ≤5.0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	5	
≤4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	3	5	4	4	4	4	5	4	2	3	3	4	45	

区分には少数第 2 位までのデータを用いたため、後の資料からの集計と異なる場合がある。  
 (例えば、5.01 は四捨五入で 5.0 となるが、ここでは 5.0< に数えた)。捕集期間は月の集計日の違いにより、通常の方法と異なる。

表 6 Wet-Only 捕集装置による湿性降下物試料成分の範囲、平均値 (環科セ)

		最高	最低	単純平均	加重平均
pH		6.68	4.10	5.41	5.24
EC	μS/cm	55.30	2.56	12.82	8.89
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	μg/mL	6.355	0.161	1.039	0.608
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		8.166	0.106	1.273	0.657
Cl <sup>-</sup>		5.317	0.078	0.813	0.629
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>		2.105	0.074	0.449	0.276
Na <sup>+</sup>		2.957	0.002	0.443	0.325
K <sup>+</sup>		0.254	0.000	0.056	0.032
Ca <sup>2+</sup>		2.119	0.035	0.283	0.111
Mg <sup>2+</sup>		0.346	0.001	0.081	0.050




図 6 加重平均 pH 値の経月変化

### (3) EC および各成分

令和4年度の環科セの最高濃度、最低濃度、平均濃度を表6(8ページ)、加重平均濃度の経月変化を表7、図7(10ページ)に示す。イオン成分のうち年間の加重平均値が最も高濃度となったのは陰イオンがNO<sub>3</sub><sup>-</sup>で0.66μg/mL、陽イオンがNa<sup>+</sup>で0.32μg/mLであった。

降水量の少なかった12月または1月にほとんどの成分が高い濃度を示した。Cl<sup>-</sup>およびNa<sup>+</sup>は11月にもっとも高い濃度を示した。これは伊勢湾からの海塩粒子の影響が強く表れたと考えられる。

また、それぞれの週におけるNa<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>比や、主要な陰イオンである[SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]+[NO<sub>3</sub><sup>-</sup>]と主要な陽イオンである[NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]+[H<sup>+</sup>]+[Ca<sup>2+</sup>]について比の変化を図8(11ページ)に示す。

Na<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>比は変動しており、年間の平均値は0.73であり海塩の組成比(約0.85)と比べやや低い結果となった。

([SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]+[NO<sub>3</sub><sup>-</sup>])/([NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]+[H<sup>+</sup>])と([SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]+[NO<sub>3</sub><sup>-</sup>])/([NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]+[H<sup>+</sup>]+[Ca<sup>2+</sup>])については、おおむね一致していた。

平成12年度以降のECおよび各成分の加重年平均値の経年変化を図9に示す。多くの成分で経年的に減少傾向が認められたが、最近では横ばいで推移している。令和4年度は令和3年度に比べほとんどの成分でやや減少した一方で、海塩粒子の成分であるCl<sup>-</sup>、Na<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup>については経年的に依然として増加傾向が認められている。

全国環境研協議会 酸性雨広域大気汚染調査研究部会の報告<sup>1)</sup>では、汚染物質について移流の影響を示唆しており、近年の中国ではSO<sub>2</sub>排出量およびNO<sub>x</sub>排出量が経年的に減少傾向にあることから<sup>2)</sup>、名古屋に降った酸性雨に含まれるSO<sub>4</sub><sup>2-</sup>およびNO<sub>3</sub><sup>-</sup>の経年的な減少傾向とも一致している。

各成分の濃度について、増加または減少の傾向があるのか、あるいは年毎の一定のぶれの範囲内(ex. 降雨量による影響のぶれ等)なのかの判断の為には、今後数年にわたる傾向の分析が必要となる。

表7 各月の加重平均濃度：Wet-Only 捕集装置(環科セ)

月	降水量	pH	EC	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Cl <sup>-</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>
	mm		μS/cm	μg/mL							
4月	78.34	5.46	9.44	0.79	1.11	0.50	0.36	0.25	0.030	0.23	0.057
5月	248.09	5.38	6.72	0.51	0.57	0.37	0.33	0.16	0.019	0.08	0.032
6月	149.97	5.50	5.60	0.43	0.54	0.17	0.28	0.05	0.020	0.10	0.013
7月	272.52	5.17	7.70	0.61	0.62	0.25	0.30	0.09	0.017	0.08	0.023
8月	168.44	4.96	9.28	0.65	0.78	0.28	0.30	0.11	0.019	0.04	0.023
9月	291.27	5.22	9.69	0.51	0.45	1.06	0.15	0.60	0.050	0.07	0.075
10月	63.30	5.26	8.87	0.64	0.78	0.51	0.28	0.26	0.018	0.10	0.048
11月	104.36	5.41	15.15	0.60	0.50	2.36	0.20	1.31	0.046	0.11	0.158
12月	20.22	5.37	12.76	0.78	1.11	1.32	0.31	0.67	0.050	0.27	0.090
1月	25.19	5.63	11.97	0.77	1.38	0.69	0.40	0.48	0.129	0.55	0.081
2月	42.04	5.60	9.70	1.35	0.83	0.45	0.38	0.25	0.055	0.38	0.073
3月	77.74	5.13	11.07	0.82	1.00	0.64	0.34	0.36	0.065	0.24	0.050
年間合計	1541.48	5.24	8.89	0.61	0.66	0.63	0.28	0.32	0.032	0.11	0.050




図7 加重月平均値の経月変化




図8 イオン成分のバランスについて




図9 平成12年度以降のECおよび各成分の加重年平均値の経年変化

## 2. 乾性降下物

### I 調査目的

地方自治体の環境研究所を会員とする全国環境研協議会(以下全環研)では、日本を網羅する全国調査を平成3年度から共同で行っている。全環研調査は酸性沈着の全国状況把握を目的とし、①国際標準である降水時開放型捕集装置による湿性沈着調査、②フィルターパックおよびパッシブ法による乾性沈着調査、③インファレンシャル法による乾性沈着量評価、および湿性と合わせた総沈着量の評価を行っている。乾性調査では全環研調査の手法が環境省調査およびEANETに活用されていることなどから、この手法による調査データは環境省データと十分に比較可能である。

名古屋市もこの共同調査に参加し、酸性沈着の把握のため、前章の湿性降下物調査(①)だけでなく、フィルターパック法による乾性降下物調査(②)も行ってきた。令和4年度も乾性沈着量の把握のため、乾性降下物調査を行った。

### II 調査地点

令和4年度の調査地点は、湿性降下物調査と同じ名古屋市環境科学調査センター屋上である。

平成15年度から平成21年度までは、鳴海にて試料採取を行っていたが、平成22年度以降は環科セに調査地点を変更した。

### III 調査方法

乾性沈着調査はフィルターパック法により行った。フィルターパック法は、1段目で粒子状物質を、2段目で $\text{HNO}_3$ などを、3段目で $\text{SO}_2$ 、 $\text{HCl}$ を、4段目で $\text{NH}_3$ を捕集する4段ろ紙法を用いた。

#### IV 調査結果

##### (1)ガス状成分

平成 22 年度から令和 4 年度の環科セのガス状成分の年平均濃度、および、鳴海の平成 15 年度から平成 21 年度の経年変化を表 8 に、グラフを図 10 に示す。平成 18、19 年度は欠測期間が長いため参考値とした。経年的な変化をみると、SO<sub>2</sub>および NH<sub>3</sub>で減少傾向がみられ、HCl は増加傾向、HNO<sub>3</sub>では横ばいであった。

また、令和 4 年度のガス状成分の月平均濃度を表 9、月平均濃度の令和 4 年度と令和 3 年度との比較を図 11 に示す。すべての成分で、年度の前半で高濃度、後半で低濃度となった。春季から夏季には NH<sub>3</sub>、NO<sub>3</sub>や HCl といった物質は粒子化せずにガス状態にあるため高濃度となり、冬季には粒子化してガス状態として捕集される量が少なくなった可能性がある。また HNO<sub>3</sub>については、二次生成の影響も考えられる。これらの傾向は、過去の全国的な変化<sup>1)</sup>とも一致しており、一般的にみられる季節変動だと考えられる。令和 4 年度と令和 3 年度の比較では概ね同様の推移を示した。

表 8 ガス状成分の年平均濃度

(nmol/m<sup>3</sup>)

年度	SO <sub>2</sub> (g)	HNO <sub>3</sub> (g)	HCl(g)	NH <sub>3</sub> (g)	備考
H15	70.2	27	19.3	206.6	鳴海
H16	63.2	26.9	27.2	190.6	鳴海
H17	63.1	31.7	26.8	195.3	鳴海
H18	(45.8)	(25.5)	(23.0)	(175.8)	鳴海、7 か月欠測
H19	(51.6)	(8.7)	(19.2)	(148.5)	鳴海、7 か月欠測
H20	50.5	30.7	32.0	148.4	鳴海
H21	32.9	22.6	22.1	145.9	鳴海
H22	40.3	19.4	23.8	130.7	環科セ
H23	45.0	18.2	26.7	136.1	環科セ
H24	48.6	24.2	30.6	130.4	環科セ
H25	41.3	25.4	32.2	104.3	環科セ
H26	34.3	22.1	22.9	85.4	環科セ
H27	47.4	26.0	31.3	130.2	環科セ
H28	33.1	24.8	42.3	102.5	環科セ
H29	34.9	23.1	28.2	105.1	環科セ
H30	37.7	24.4	37.0	117.4	環科セ
R1	37.0	25.0	40.7	131.2	環科セ
R2	25.5	20.9	34.9	111.5	環科セ
R3	31.9	22.2	48.0	152.5	環科セ
<b>R4</b>	<b>23.8</b>	<b>20.1</b>	<b>32.4</b>	<b>142.5</b>	<b>環科セ</b>

表9 ガス状成分の月平均濃度(環科セ)

	SO <sub>2</sub> (g)	HNO <sub>3</sub> (g)	HCl(g)	NH <sub>3</sub> (g)
R4年4月	38.6	36.1	43.4	183.4
R4年5月	30.2	40.1	43.6	175.6
R4年6月	20.4	34.5	65.6	224.7
R4年7月	19.6	22.1	34.9	172.6
R4年8月	21.8	20.7	38.6	158.2
R4年9月	25.6	15.9	39.7	149.5
R4年10月	25.4	15.5	27.2	134.1
R4年11月	25.5	10.9	21.7	120.5
R4年12月	13.4	4.9	17.7	75.2
R5年1月	17.2	5.7	2.9	78.7
R5年2月	13.7	7.2	14.9	85.5
R5年3月	25.9	15.4	28.4	141.9
最大値	38.6	40.1	65.6	224.7
最小値	13.4	4.9	2.9	75.2




図10 ガス状成分の経年変化




図 11 ガス状成分の月平均濃度前年度との比較

(2)粒子状成分

令和4年度の粒子状成分の年平均濃度および平成15年度からの経年変化を表10および図12に示す。すべての成分で、令和3年度の値を下回る結果となった。長期的にはnss-SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>(p)やNH<sub>4</sub><sup>+</sup>(p)について、減少の傾向がみられ、海塩粒子の成分であるCl<sup>-</sup>(p)やNa<sup>+</sup>(p)について、増加の傾向がみられた。

また、令和4年度の粒子状成分の月平均濃度を表11、月平均濃度の令和4年度と令和3年度との比較を図13に示す。令和4年度と令和3年度の比較では概ね同様の推移を示した。NO<sub>3</sub><sup>-</sup>(p)、Cl<sup>-</sup>(p)は冬季に濃度が高くなり、気温低下による粒子化の影響を受けていると考えられる。nss-SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>(p)やNH<sub>4</sub><sup>+</sup>(p)は春から夏に高濃度となっており、光化学反応による二次生成や大陸からの移流の影響が考えられる。

表10 粒子状成分の年平均濃度<sup>1)</sup>

	(nmol/m <sup>3</sup> )									
	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	nss-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (p)	Cl <sup>-</sup> (p)	Na <sup>+</sup> (p)	K <sup>+</sup> (p)	Ca <sup>2+</sup> (p)	nss-Ca <sup>2+</sup> (p)	Mg <sup>2+</sup> (p)	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (p)
H15	48.2	47.1	51.7	12.2	18.4	4.1	6.7	6.3	3.0	106.2
H16	50.9	49.5	46.1	16.4	23.1	3.8	7.5	7.0	3.9	103.9
H17	51.5	50.4	45.1	14.4	18.6	2.7	8.2	7.8	2.6	109.6
H18 <sup>2)</sup>	(31.2)	(30.6)	(230)	(6.2)	(9.8)	(1.4)	(4.2)	(3.9)	(1.2)	(62.0)
H19 <sup>2)</sup>	(36.0)	(35.0)	(46.2)	(17.6)	(15.9)	(3.3)	(6.0)	(5.7)	(1.6)	(87.6)
H20	44.7	43.3	36.4	9.8	23.4	3.6	6.7	6.1	2.7	83.5
H21	33.6	32.3	30.7	7.0	21.2	4.9	7.7	7.2	2.4	75.7
H22	30.2	30.0	26.5	9.7	19.0	2.5	5.1	4.7	2.3	62.4
H23	32.7	31.0	31.6	14.1	27.1	3.4	6.7	6.2	2.5	71.2
H24	39.3	37.3	36.6	16.2	32.3	3.9	7.1	6.4	3.3	72.0
H25	44.4	42.6	34.8	15.8	30.5	5.2	8.8	8.1	3.4	81.1
H26	40.2	38.5	35.7	16.4	30.9	3.6	11.6	10.9	4.1	71.6
H27	39.5	37.6	42.3	17.7	30.5	3.3	130	12.3	4.5	65.1
H28	33.8	32.0	34.3	14.9	30.5	3.0	8.2	7.5	4.1	57.5
H29	32.0	30.3	37.6	16.7	27.3	4.1	9.3	8.7	3.7	59.3
H30	30.6	28.5	33.4	21.8	33.3	3.5	9.7	9.0	4.8	53.3
R1	31.0	28.7	34.2	22.2	37.5	3.8	8.6	7.8	4.7	49.2
R2	25.9	23.9	31.0	20.1	31.8	3.0	7.7	7.0	4.0	41.7
R3	27.1	24.8	38.8	24.3	38.0	3.6	10.5	9.7	4.8	45.6
<b>R4</b>	<b>21.1</b>	<b>19.3</b>	<b>28.1</b>	<b>16.6</b>	<b>29.8</b>	<b>2.3</b>	<b>7.8</b>	<b>7.2</b>	<b>3.0</b>	<b>39.3</b>

1) 測定地点 H15~21：鳴海、H22~R4：環科セ

2) H18 および H19 は7カ月欠測だったので参考値扱いとした。

表 11 粒子状成分の月平均濃度

(nmol/m<sup>3</sup>)

	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	nss- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (p)	Cl <sup>-</sup> (p)	Na <sup>+</sup> (p)	K <sup>+</sup> (p)	Ca <sup>2+</sup> (p)	nss- Ca <sup>2+</sup> (p)	Mg <sup>2+</sup> (p)	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (p)
R4.4	36.9	35.0	49.0	12.1	30.7	3.7	13.4	12.7	3.7	68.4
R4.5	30.3	28.2	31.1	13.5	34.6	3.2	9.8	9.0	3.7	48.7
R4.6	25.4	23.5	21.5	5.9	31.6	1.3	8.6	7.9	2.8	41.2
R4.7	17.2	15.5	16.1	10.9	28.1	1.0	4.6	4.0	2.0	25.4
R4.8	27.4	25.6	16.3	7.3	30.1	2.6	5.9	5.2	3.3	42.7
R4.9	19.7	16.0	29.2	37.8	62.7	2.8	7.4	6.0	7.1	19.7
R4.10	16.5	15.3	21.9	9.7	19.7	1.7	4.7	4.2	1.5	23.9
R4.11	17.0	15.4	26.5	23.3	26.9	2.2	5.5	4.9	2.1	32.0
R4.12	13.8	12.3	24.8	21.1	24.0	2.4	6.2	5.7	2.7	32.2
R5.1	14.0	12.9	31.0	18.4	17.2	2.6	7.5	7.1	1.8	41.8
R5.2	15.8	14.5	29.2	18.9	21.0	1.8	6.8	6.3	2.0	50.7
R5.3	19.9	18.0	40.6	19.8	31.5	2.2	13.8	13.1	3.9	44.5
最大値	36.9	35.0	49.0	37.8	62.7	3.7	13.8	13.1	7.1	68.4
最小値	13.8	12.3	16.1	5.9	17.2	1.0	4.6	4.0	1.5	19.7




図 12 粒子状成分の経年変化




図 13 粒子状成分の月平均濃度前年度との比較

(3)ガス状および粒子状成分の総計と粒子化率

全硫酸 ( $\text{SO}_2(\text{g})+\text{nss}\cdot\text{SO}_4^{2-}(\text{p})$ ), 全硝酸 ( $\text{HNO}_3(\text{g})+\text{NO}_3^-(\text{p})$ ), 全塩化物 ( $\text{HCl}(\text{g})+\text{Cl}^-(\text{p})$ ), 全アンモニア ( $\text{NH}_3(\text{g})+\text{NH}_4^+(\text{p})$ ) 濃度の月平均値の経月変化と粒子化率 (粒子状濃度 / (粒子状濃度 + ガス状濃度)) を図 14 に示す。

例年は春または夏に高濃度となることが多いが、令和 4 年度は全ての成分について、例年通り春から夏にかけて高濃度となる傾向が認められた。粒子化率は全硝酸、全塩酸、全アンモニアは気温が低下する冬季に上昇する傾向があり、例年通りの変動であった。また全硫酸と全アンモニアはある程度共通した変動を示した。これは、粒子化した硫酸が対カチオンとしてアンモニウムイオンを捕獲したためと考えられる。




図 14 全硫酸、全硝酸、全塩化物、全アンモニア濃度の経月変化 (令和 4 年度)

3. 参考文献

- 1) 第 5 次酸性雨全国調査報告書 (平成 21 年度), 全国環境研究会誌, **36**, 106-146, 2011
- 2) 平成 30 年度 主要国の大気環境分野における環境規制等動向, (株)三菱総合研究所, 2019

資料1 令和4年度 Wet-Only 捕集装置で捕集した湿性降下物の測定結果(環科セ)

地点名	月	捕集		欠測日数	捕集量 mL	降水量 mm	オーバーフロー 有無	pH
		開始日	終了日					
環科セ	4月	R4.3.28	R4.4.4	0	130	4.1	無	6.239
	4月	R4.4.4	R4.4.11	0	0	0	無	
	4月	R4.4.11	R4.4.18	0	1520	48.4	無	5.459
	4月	R4.4.18	R4.4.25	0	810	25.8	無	5.398
	5月	R4.4.25	R4.5.2	0	2110	67.2	無	5.023
	5月	R4.5.2	R4.5.9	0	0	0	無	
	5月	R4.5.9	R4.5.16	0	1910	60.8	無	5.654
	5月	R4.5.16	R4.5.2	0	160	5.1	無	5.323
	5月	R4.5.23	R4.5.30	0	2290	72.9	無	5.657
	5月	R4.5.30	R4.6.6	0	1320	42.0	無	5.709
	6月	R4.6.6	R4.6.13	0	321	10.2	無	5.566
	6月	R4.6.13	R4.6.20	0	738	23.5	無	5.885
	6月	R4.6.20	R4.6.27	0	1810	57.6	無	5.63
	6月	R4.6.27	R4.7.4	0	1840	58.6	無	5.324
	7月	R4.7.4	R4.7.11	0	2960	94.3	無	5.419
	7月	R4.7.11	R4.7.19	0	3650	116.2	無	5.018
	7月	R4.7.19	R4.7.25	0	1437	45.8	無	5.159
	7月	R4.7.25	R4.8.1	0	510	16.2	無	5.52
	8月	R4.8.1	R4.8.8	0	145	4.6	無	5.578
	8月	R4.8.8	R4.8.15	0	890	28.3	無	4.93
	8月	R4.8.15	R4.8.22	0	2720	86.6	無	5.257
	8月	R4.8.22	R4.8.29	0	1534	48.9	無	4.682
	9月	R4.8.29	R4.9.5	0	1190	37.9	無	5.146
	9月	R4.9.5	R4.9.12	0	3128	99.6	無	4.986
	9月	R4.9.12	R4.9.20	0	1790	57.0	無	5.28
	9月	R4.9.20	R4.9.26	0	3038	96.8	無	5.762
	10月	R4.9.26	R4.10.3	0	64	2.0	無	4.773
	10月	R4.10.3	R4.10.11	0	1385	44.1	無	5.223
	10月	R4.10.11	R4.10.17	0	21.5	0.7	無	5.574
	10月	R4.10.17	R4.10.24	0	52	1.7	無	5.321
	10月	R4.10.24	R4.10.31	0	0	0	無	
	10月	R4.10.31	R4.11.7	0	465	14.8	無	5.532
	11月	R4.11.7	R4.11.14	0	300	9.6	無	5.455
	11月	R4.11.14	R4.11.21	0	487	15.5	無	5.732
	11月	R4.11.21	R4.11.28	0	1130	36.0	無	5.238
	11月	R4.11.28	R4.12.5	0	1360	43.3	無	5.508
	12月	R4.12.5	R4.12.12	0	0	0	無	
	12月	R4.12.12	R4.12.19	0	210	6.7	無	5.31
	12月	R4.12.19	R4.12.26	0	425	13.5	無	5.403
	12月	R4.12.26	R5.1.4	0	0	0	無	
	1月	R5.1.4	R5.1.10	0	28	0.9	無	5.164
	1月	R5.1.10	R5.1.16	0	616	19.6	無	5.58
1月	R5.1.16	R5.1.23	0	0	0	無		
1月	R5.1.23	R5.1.30	0	147	4.7	無	6.681	
2月	R5.1.30	R5.2.6	0	0	0	無		
2月	R5.2.6	R5.2.13	0	900	28.7	無	6.015	
2月	R5.2.13	R5.2.20	0	248	7.9	無	5.149	
2月	R5.2.20	R5.2.27	0	172	5.5	無	5.418	
3月	R5.2.27	R5.3.6	0	37	1.2	無	4.097	
3月	R5.3.6	R5.3.13	0	344	11.0	無	6.089	
3月	R5.3.13	R5.3.20	0	590	18.8	無	5.74	
3月	R5.3.20	R5.3.27	0	1470	46.8	無	5.032	

EC	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Cl <sup>-</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	H <sup>+</sup>	不溶物質
mS/m	μmol/L									g/m <sup>2</sup>
2.04	20.21	41.48	39.78	29.13	34.02	1.42	26.79	8.77	0.58	1.061
0.99	9.05	17.62	16.54	20.13	13.19	1.04	5.13	2.54	3.48	1.508
0.69	4.84	14.68	5.6	18.11	3.21	0.18	3.8	0.97	4	0.416
0.89	6.19	6.31	22.36	14.13	16.34	0.5	1.75	2.86	9.48	1.664
0.67	6.3	11.13	5.93	25.57	2.81	0.38	2.00	0.58	2.22	1.986
2.93	31.23	90.56	18.46	116.69	12.19	2.63	17.96	4.65	4.75	0.000
0.38	2.48	3.78	5.08	8.41	3.17	0.37	1.03	0.44	2.2	1.404
0.56	4.02	10.23	5.54	21.01	2.69	0.47	1.48	1.1	1.95	1.061
1.37	9.06	30.71	25.64	29.18	18.72	1.31	7.96	4.21	2.72	0.926
0.82	6.74	16.44	9.14	29.91	4.77	1.7	4.52	1.3	1.3	0.031
0.43	3.55	6.02	2.21	11.49	0.08	0.19	1.86	0.02	2.34	0.000
0.45	3.62	4.51	2.27	11.02	0.35	0.2	1.22	0.1	4.74	0.468
0.58	4.95	7.57	6.44	14.07	4.27	0.43	1.77	0.78	3.81	1.373
0.99	8.64	12.31	7.88	21.5	4.56	0.6	2.83	1.3	9.59	2.756
0.68	4.7	10.49	3.8	12.47	1.1	0.01	0.86	0.21	6.93	0.926
0.57	3.07	6.44	13.31	10.36	7.88	0.38	0.99	1.63	3.02	0.000
0.85	5.91	22.28	6.02	34.31	2.46	0.61	1.94	3.42	2.64	0.198
1.13	6.72	10.65	15.65	20.66	10.18	0.56	1.04	1.94	11.75	0.447
0.57	4.14	6.89	5.3	9.9	2.34	0.49	0.87	0.46	5.53	0.551
1.46	11.65	22.95	8.35	23.71	5.6	0.38	1.35	0.95	20.8	1.102
1.09	6.91	15.87	18.66	16.08	16.03	0.84	2.12	2.64	7.14	1.061
1.04	6.56	11.33	22.41	10.19	19.13	0.96	1.16	2.07	10.33	0.302
1.97	8.47	3.93	96.65	6.58	84.07	1.4	1.96	9.02	5.25	0.946
0.26	1.68	1.71	2.27	4.13	2.74	1.75	1.77	0.81	1.73	0.385
2.65	22.77	66.68	35.43	37.77	41.2	2.2	11.2	13.03	16.87	0.000
0.73	5.61	9.72	8.55	12.42	6.07	0.19	1.57	1.1	5.98	0.676
1.96	9.8	37.52	71.93	57.86	55.25	4.71	6.4	8.18	2.67	0.000
1.56	23.43	24.93	16.57	42.93	10.17	2.18	8.57	4.05	4.78	0.000
0.98	5.53	11.21	25.37	16.77	21.37	0.68	2.66	2.53	2.94	0.000
0.96	8.29	14.38	11.94	25.25	9.35	0.41	3.74	1.41	3.51	0.000
0.43	2.8	5.51	6.22	9.03	5.08	0.8	2.18	1.15	1.85	0.270
0.54	1.99	5.91	6.86	5.04	5.31	0.12	1.24	0.82	5.78	0.177
2.84	10.67	9.2	149.98	13.09	128.59	2.36	3.77	14.25	3.1	0.000
1.56	12.37	23.31	32.66	21.85	28.51	0.74	10.35	4.19	4.9	0.000
1.14	6	15.29	39.3	14.72	29.71	1.54	5.07	3.45	3.95	0.218
3.79	37.87	131.69	43.61	109.16	45.22	6.49	36.23	7.43	6.85	0.000
0.89	4.55	15.99	15.2	17.97	16.7	3.39	3.36	2.01	2.63	0.302
1.98	16.93	27.7	33.09	24.15	34.27	2.38	52.87	8.13	0.21	4.336
0.80	12.47	11.19	12.82	18.38	10.44	1.53	7.87	2.77	0.97	7.217
1.79	26.14	22.21	17.69	31.50	17.87	1.57	19.51	5.09	7.10	1.841
0.68	5.19	12.35	5.47	19.13	3.02	0.51	4.14	1.37	3.82	0.000
5.53	66.16	45.71	37.23	64.95	43.13	6.29	17.41	6.66	79.98	0.343
1.92	16.74	20.3	82.49	27.85	69.97	4.99	16.97	7.35	0.81	2.236
0.54	3.8	10.37	7.92	12.23	7.56	1.18	4.2	1.49	1.82	0.905
1.03	7.04	16.62	6.65	18.05	5.4	0.96	3.91	0.94	9.29	4.232

資料2 令和4年度フィルターパック法による乾性降下物の測定結果（環科セ）

月	開始日時	終了日時	調査	積算流量	SO <sub>2</sub> (g)	HNO <sub>3</sub> (g)	HCl(g)	NH <sub>3</sub> (g)
			日数	m <sup>3</sup>	nmol/m <sup>3</sup>			
4月	R4.3.28	R4.4.4	7	21.22	41.00	15.78	43.12	144.89
4月	R4.4.4	R4.4.11	7	22.27	54.34	58.10	54.00	201.07
4月	R4.4.11	R4.4.18	7	21.87	32.22	29.84	38.28	180.70
4月	R4.4.18	R4.4.25	7	20.53	26.73	40.67	38.28	206.85
5月	R4.4.25	R4.5.2	7	20.18	22.91	16.40	38.35	139.34
5月	R4.5.2	R4.5.9	7	19.78	48.07	31.88	49.50	157.02
5月	R4.5.9	R4.5.16	7	19.74	32.31	27.25	42.27	183.99
5月	R4.5.16	R4.5.23	7	20.00	44.59	98.57	45.95	272.19
5月	R4.5.23	R4.5.30	7	19.31	22.44	30.57	45.85	184.75
5月	R4.5.30	R4.6.6	7	20.06	11.46	37.54	40.04	118.84
6月	R4.6.6	R4.6.13	7	21.78	15.50	15.17	31.30	147.66
6月	R4.6.13	R4.6.20	7	19.47	22.04	49.01	38.25	224.88
6月	R4.6.20	R4.6.27	7	19.97	13.95	37.04	138.28	279.46
6月	R4.6.27	R4.7.4	7	20.76	30.37	37.46	54.19	247.90
7月	R4.7.4	R4.7.11	7	21.46	14.71	17.95	28.08	168.60
7月	R4.7.11	R4.7.19	8	23.61	21.37	23.36	31.79	161.78
7月	R4.7.19	R4.7.25	6	18.50	20.43	35.82	45.59	180.47
7月	R4.7.25	R4.8.1	7	19.76	21.85	11.71	35.60	182.20
8月	R4.8.1	R4.8.8	7	20.78	23.45	18.97	49.51	165.26
8月	R4.8.8	R4.8.15	7	21.40	25.27	11.09	40.32	146.60
8月	R4.8.15	R4.8.22	7	21.40	25.27	11.09	40.32	146.60
8月	R4.8.22	R4.8.29	7	20.96	18.50	20.14	31.01	150.09
9月	R4.8.29	R4.9.5	7	20.51	20.54	13.47	36.54	152.33
9月	R4.9.5	R4.9.12	7	19.53	37.67	16.76	48.96	165.21
9月	R4.9.12	R4.9.20	8	21.96	27.15	23.45	43.87	156.48
9月	R4.9.20	R4.9.26	6	16.99	15.71	8.00	27.15	118.50
10月	R4.9.26	R4.10.3	7	19.99	41.65	9.45	44.48	144.53
10月	R4.10.3	R4.10.11	8	22.93	24.05	37.56	30.61	135.22
10月	R4.10.11	R4.10.17	6	17.29	33.71	14.05	35.47	151.14
10月	R4.10.17	R4.10.24	7	19.72	23.96	15.72	25.51	120.19
10月	R4.10.24	R4.10.31	7	18.95	22.42	11.40	20.76	105.70
10月	R4.10.31	R4.11.7	7	17.95				
11月	R4.11.7	R4.11.14	7	22.31	43.22	19.52	27.93	177.28
11月	R4.11.14	R4.11.21	7	21.31	23.44	9.85	23.49	115.40
11月	R4.11.21	R4.11.28	7	21.00	21.53	10.01	20.41	112.16
11月	R4.11.28	R4.12.5	7	20.81	14.22	4.19	14.82	77.76
12月	R4.12.5	R4.12.12	7	22.52	18.95	6.68	24.14	109.32
12月	R4.12.12	R4.12.19	7	20.08	14.57	4.54	16.82	72.08
12月	R4.12.19	R4.12.26	7	20.46	9.85	3.99	14.35	63.30
12月	R4.12.26	R5.1.4	9	27.33	11.00	4.39	16.07	60.53
1月	R5.1.4	R5.1.10	6	20.26	14.87	5.30	3.17	63.04
1月	R5.1.10	R5.1.16	6	20.16	24.86	5.44	2.53	116.79
1月	R5.1.16	R5.1.23	7	20.25	16.29	7.25	2.75	75.36
1月	R5.1.23	R5.1.30	7	20.26	13.29	4.61	3.22	62.13
2月	R5.1.30	R5.2.6	7	18.02	13.32	6.27	16.49	99.59
2月	R5.2.6	R5.2.13	7	18.35	20.78	11.84	18.13	118.29
2月	R5.2.13	R5.2.20	7	20.44	10.27	5.26	11.56	66.67
2月	R5.2.20	R5.2.27	7	20.76	10.60	5.65	13.41	58.10
3月	R5.2.27	R5.3.6	7	20.30	26.84	12.32	26.34	118.84
3月	R5.3.6	R5.3.13	7	20.11	37.40	23.45	36.43	194.41
3月	R5.3.13	R5.3.20	7	22.32	18.78	10.93	27.32	115.91
3月	R5.3.20	R5.3.27	7	19.76	20.46	14.88	23.66	138.49

地点名

注)令和4年10月第6週は試料採取にリークが認められたため欠測

SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	nss-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (p)	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (p)	HCl(p)	Na <sup>+</sup> (p)	K <sup>+</sup> (p)	Ca <sup>2+</sup> (p)	nss-Ca <sup>2+</sup> (.)	Mg <sup>2+</sup> (p)	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (p)
n mol/m <sup>3</sup>									
24.9	22.2	53.3	27.1	45.5	3.4	11.0	10.0	4.6	54.4
44.0	42.2	55.0	5.4	30.1	4.2	17.6	16.9	4.0	77.4
34.7	33.1	37.3	11.3	27.2	2.8	11.2	10.6	3.2	59.4
43.9	42.7	50.6	4.7	20.1	4.5	13.7	13.3	3.2	82.5
20.3	19.0	35.5	43.6	21.8	36.5	2.3	1.8	15.7	9.1
30.6	28.1	26.3	8.3	42.4	16.3	3.0	2.1	15.6	4.9
18.4	16.9	28.1	5.2	23.9	14.8	2.3	1.8	13.5	4.3
51.3	47.3	32.1	2.3	66.9	7.7	4.1	2.7	24.6	4.3
31.4	29.1	30.3	4.6	37.1	20.1	2.6	1.8	15.7	5.7
30.3	28.0	34.2	17.0	38.4	25.1	2.3	1.5	14.4	6.4
15.3	13.6	21.6	5.9	28.7	0.9	8.0	7.4	2.3	27.8
27.0	25.4	25.0	2.8	25.5	1.6	7.3	6.7	2.8	46.8
40.1	37.6	21.7	9.6	42.8	1.6	9.5	8.6	3.9	57.7
19.4	17.6	17.8	5.4	29.3	1.1	9.5	8.8	2.1	32.9
14.9	13.4	18.3	4.8	23.7	1.4	4.3	3.8	1.3	22.2
16.9	15.8	12.7	4.3	18.1	0.6	3.3	2.9	1.0	26.2
22.8	21.5	17.5	2.4	21.3	0.8	6.2	5.7	1.3	37.7
14.5	11.4	16.5	33.1	51.3	1.1	4.7	3.6	4.5	16.3
22.6	20.9	23.3	7.3	26.6	21.7	1.9	1.4	10.7	5.4
31.9	29.7	14.5	15.8	36.4	24.0	2.3	1.5	8.5	6.7
23.0	21.3	13.4	2.7	29.5	11.1	2.7	2.0	9.8	3.1
32.0	29.5	14.2	3.5	40.8	14.0	2.5	1.6	10.5	3.8
16.8	14.2	25.6	19.9	43.0	2.3	5.9	5.0	5.0	16.3
17.0	14.9	30.5	10.3	34.4	2.3	6.5	5.8	4.1	22.5
29.3	22.1	30.5	91.8	119.5	4.0	10.9	8.3	13.3	19.8
13.8	11.1	30.3	20.0	44.4	2.4	5.6	4.6	4.7	20.5
30.4	29.2	26.0	4.3	18.6	2.1	5.2	4.8	1.5	48.9
11.6	10.0	20.2	14.4	25.7	1.4	3.4	2.9	1.8	11.2
14.9	13.3	27.9	13.9	26.3	2.0	4.9	4.3	1.9	22.4
15.7	15.0	20.6	5.2	13.2	1.7	4.5	4.3	1.1	24.6
10.3	9.4	15.6	10.6	14.7	1.6	5.4	5.1	1.0	14.2
27.7	26.6	46.8	10.5	17.9	3.4	8.7	8.3	1.5	62.4
15.4	14.5	19.2	8.5	14.7	1.8	3.9	3.6	1.0	26.0
14.6	12.7	23.1	25.4	31.6	1.9	5.0	4.3	2.3	23.4
10.5	7.9	17.3	49.1	43.4	1.8	4.4	3.5	3.5	16.6
16.8	14.9	29.4	24.5	31.4	2.8	7.0	6.3	4.0	34.2
13.2	11.8	25.8	22.9	22.8	2.7	9.4	8.9	2.9	30.2
10.3	9.1	19.2	21.4	19.2	2.7	5.1	4.7	1.9	30.1
14.5	13.2	24.8	16.8	22.9	1.8	3.9	3.4	2.3	33.7
18.2	17.5	40.5	13.2	12.4	2.4	5.6	5.3	1.1	60.6
13.3	12.3	38.2	20.5	16.7	3.2	7.8	7.4	1.5	47.5
13.2	11.7	20.8	22.0	24.4	2.3	9.4	8.9	3.0	26.9
11.7	10.8	26.5	17.3	14.9	2.4	7.0	6.7	1.5	35.4
15.4	14.2	28.1	19.1	21.1	1.9	7.5	7.0	1.7	49.6
18.2	16.8	34.1	18.0	23.0	2.3	9.4	8.9	2.4	53.1
16.0	14.6	34.5	22.0	22.3	1.7	5.7	5.2	2.3	58.0
13.5	12.5	20.3	16.5	17.5	1.3	4.5	4.1	1.8	42.0
18.3	16.4	34.9	23.3	32.5	2.0	9.8	9.1	3.9	46.6
33.5	30.9	62.5	27.5	43.0	3.5	24.0	23.1	5.2	69.5
14.4	12.3	30.2	21.4	34.2	1.8	11.9	11.2	3.9	29.0
13.4	12.4	34.8	7.0	16.6	1.6	9.6	9.2	2.4	32.8